

GASTRO-INTESTINAL LOW FAT DIET

Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van maag-darmaandoeningen. Daarom zal uw dierenarts uw hond meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Bij de behandeling van braken en/of diarree is Royal Canin Gastro-Intestinal Low Fat Diet een geschikte dieetvoeding. Dit dieet is speciaal ontwikkeld voor honden met maag-darmaandoeningen.

Gastro-Intestinal Low Fat Diet



Droogvoeding
Verpakking van 1,5kg, 6kg en 12kg



Blikvoeding
van 410g

Ingrediënten

Droogvoeding: Rijst, gedehydriseerd gevogeltevlees, tarwe, gerst, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, dierlijke vetten, gist, mineralen, Fructo-Oligo-Sacchariden, psylliumschillen en -zaden, visolie, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).

Natvoeding (blik): Vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, mineralen, oliën en vetten, gist.

Waarschuwing

Royal Canin Intestinal Low Fat Diet is niet geschikt voor drachtige of zogende teven.

Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Gastro-Intestinal Low Fat Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding die laevenslang gegeven kan worden.



Ondersteuning van de spijsvertering

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, rijst, speciale voedingsvezels en visolie zorgt voor een evenwichtige darmflora en een optimale verteerbaarheid.



Laag vetgehalte

Een laag vetgehalte verbetert de vertering bij honden die problemen hebben met de vertering van vet, zoals bij hyperlipidemie en pancreatitis.



Verlaagd vezelgehalte

De geringe hoeveelheid vezels in de voeding zorgt voor een makkelijke vertering en goede opname van voedingsstoffen.



Ondersteuning van het afweersysteem

De specifieke combinatie van synergetisch werkende antioxidanten (vit. C, vit. E, taurine en luteïne) draagt bij aan de neutralisatie van vrije radicalen.

Gastro-Intestinal Low Fat Diet



Droogvoeding

Volw. gewicht van de hond (kg)	Mager		Optimaal gewicht		Overgewicht	
	gram	maatbeker	gram	maatbeker	gram	maatbeker
2	75	1	60	$\frac{6}{8}$	45	$\frac{5}{8}$
4	130	$1\frac{6}{8}$	105	$1\frac{3}{8}$	75	1
6	170	$2\frac{2}{8}$	140	$1\frac{7}{8}$	105	$1\frac{3}{8}$
8	215	$2\frac{6}{8}$	170	$2\frac{2}{8}$	130	$1\frac{6}{8}$
10	250	$3\frac{2}{8}$	200	$2\frac{5}{8}$	150	2
15	335	$4\frac{3}{8}$	270	$3\frac{4}{8}$	200	$2\frac{5}{8}$
20	415	$5\frac{3}{8}$	330	$4\frac{2}{8}$	250	$3\frac{2}{8}$
25	490	$6\frac{3}{8}$	390	$5\frac{1}{8}$	295	$3\frac{7}{8}$
30	560	$7\frac{2}{8}$	445	$5\frac{6}{8}$	335	$4\frac{3}{8}$
35	625	$8\frac{1}{8}$	500	$6\frac{4}{8}$	375	$4\frac{7}{8}$
40	690	9	550	$7\frac{1}{8}$	415	$5\frac{3}{8}$
50	810	$10\frac{4}{8}$	650	$8\frac{4}{8}$	485	$6\frac{3}{8}$
60	925	12	740	$9\frac{5}{8}$	555	$7\frac{2}{8}$
70	1035	$13\frac{4}{8}$	830	$10\frac{6}{8}$	620	$8\frac{1}{8}$
80	1140	$14\frac{7}{8}$	915	$11\frac{7}{8}$	685	$8\frac{7}{8}$



Natvoeding (blik)

Volw. gewicht van de hond (kg)	Mager		Optimaal gewicht		Overgewicht	
	gram	blik	gram	blik	gram	blik
2	285	$\frac{3}{4}$	225	$\frac{1}{2}$	170	$\frac{1}{2}$
5	555	$1\frac{1}{4}$	445	1	330	$\frac{3}{4}$
10	920	$2\frac{1}{4}$	735	$1\frac{3}{4}$	550	$1\frac{1}{4}$
15	1235	3	990	$2\frac{1}{2}$	740	$1\frac{3}{4}$
20	1525	$3\frac{3}{4}$	1220	3	915	$2\frac{1}{4}$
25	1790	$4\frac{1}{4}$	1435	$3\frac{1}{2}$	1075	$2\frac{1}{2}$
30	2050	5	1640	4	1230	3
35	2290	$5\frac{1}{2}$	1835	$4\frac{1}{2}$	1375	$3\frac{1}{4}$
40	2525	$6\frac{1}{4}$	2020	5	1515	$3\frac{3}{4}$

Het verdient aanbeveling de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijden te verdelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Er zijn een aantal algemene maatregelen die u kunt nemen om uw huisdier te helpen:

- Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.
- Geef de diëtvoeding volgens voorschrift en geef geen andere tussendoortjes of snacks. Eventueel kunnen brokjes van de diëtvoeding tussendoor gegeven worden.
- Geef vaker, kleine hoeveelheden voeding om de belasting van het maag-darmkanaal te beperken. Verdeel de totale dagelijkse hoeveelheid over 4 tot 6 porties.
- Als uw huisdier is hersteld, kunt u in 3 à 4 dagen weer overschakelen naar de normale voeding. Komen de klachten terug, dan kunt u het voorgeschreven dieet ook gedurende langere tijd blijven geven.
- Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat.
- Geef uw huisdier apart te eten als er meerdere dieren in huis wonen. Probeer uw kat binnen te houden.
- Breng uw familie, vrienden en kennissen op de hoogte van het feit dat uw dier speciale diëtvoeding krijgt.
- Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving*.

* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer staan vermeld op iedere verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven op de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid.



PRAKTISCHE INFORMATIE

De Royal Canin dieetvoedingen Sensitivity Control Diet, Anallergenic Diet en Hypoallergenic Diet zijn ook geschikte voedingen bij maag-darmaandoeningen. Meer informatie over deze dieetvoedingen kunt u lezen in de brochure "Voedselovergevoeligheid bij hond en kat".

Zowel bij braken als bij diarree kan uw dierenarts een speciale elektrolyten-oplossing voorschrijven, zoals het Royal Canin Rehydration Support Diet. Deze elektrolyten-oplossing zal de hoeveelheid vocht in het lichaam op peil brengen en de elektrolytenbalans herstellen. Eventueel kan uw dierenarts ook een vloeibare voeding of een speciale dieetvoeding voor herstel voorschrijven, zoals het Convalescence Support Instant Diet of het Recovery Diet van Royal Canin. Hierover kunt u meer lezen in de brochure 'Herstel na ziekte of operatie'.



Alle dieetvoedingen van Royal Canin zijn bijzonder smakelijk dankzij de hoogwaardige ingrediënten, de vorm en structuur van de brokken en de innovatieve verpakkingsvormen. Daarnaast zijn alle dieetvoedingen verrijkt met natuurlijke antioxidanten (vitamine E, vitamine C en taurine), die helpen het natuurlijke afweersysteem van honden en katten te versterken. Zo beschermen antioxidanten de lichaamscellen tegen het ouder worden en tegen verschillende aandoeningen. Bij de ontwikkeling van de Royal Canin Veterinary Diet range is rekening gehouden met alle aspecten die van belang zijn voor de gezondheid van het dier: bevordering van het herstel en verbetering van het algemeen welzijn.

GEMIDDELDE ANALYSE HOND

	GASTRO INTESTINAL	GASTRO INTESTINAL	FIBRE RESPONS
	LOW FAT	LOW FAT	
	Droog (per 1000g)	Blik (per 1000g)	Droog (per 1000g)
Vocht %	9,5	74	9,5
Eiwit %	22	7,5	23
Vet %	7	1,7	16
Mineralen %	6,6	1,5	7,3
Zetmeel %	46,3	12,4	23,7
Overige koolhydraten %	53,2	13,6	33,1
Voedingsvezels %	8,6	2,9	20,5
Ruwe celstof %	1,7	1,7	11,1
Calcium %	1,09	0,24	1,08
Kalium %	0,7	0,14	0,8
Fosfor %	0,83	0,13	0,89
Magnesium %	0,02	0,02	0,08
IJzer mg**	183	40	186
Koper mg**	15	5	15
Zink mg**	224	35	215
Chloride %	0,63	0,2	0,49
Natrium %	0,40	0,06	0,30
Selenium mg	0,24	0,1	0,24
EPA + DHA %	0,14	0,02	0,30
Taurine %	0,21	0,14	0,20
Arginine %	1,45	0,41	1,27
Vitamine A IE	20 000	30 000	19 000
Vitamine E mg	600	150	600
Vitamine C mg	300	55	300
Vitamine D3 IE	1 000	210	1 000
Vitamine B1 mg	4,3	10	4,1
Vitamine B2 mg	3,9	3	3,8
Pantotheenzuur mg	25,9	10	25,2
Vitamine B6 mg	8,4	1	8,1
Vitamine B12 mg	0,07	0,03	0,07
Niacine mg	15,4	10	14,9
Biotine mg	1,11	0,1	1,07
Foliumzuur mg	0,9	0,35	0,8
Choline mg	1 800	450	1 500
Metaboliseerbare energie ^(G) kcal/kg	3 492	965	3 323
Metaboliseerbare energie ^(B) kcal/kg	3 638	997	3 684